

当院と他院の比較(違い)

COVID19ワクチン未接種者が多い医療機関(2024年データ)

COVI D-19 感染者	性別	ワクチン 接種 回数	感染の有 無	S蛋白 抗体 (2024)	N蛋白 抗体 (2024)	CD4 (2024)	CD8 (2024) =キ ラーT 細胞	CD56 (2024) =ナ チュ ラルキ ラー細 胞	腫瘍マーカー (CEA,CA19- 9,ProGRP,PSA ,HE4,APOA2)
1	男	0回	+	1.2	32.0	42.1	38.8	20.1	異常なし 79.1(>59.9)
2	女	0回	+	495	207.0	46.7	33.2	13.7	2回感染 異常なし 107.61(>59.9)
3	男	0回	+	10.4	7.2	43.8	40.7	19.5	異常なし 76.71(>59.9)
4	男	0回	+	874	190.0	51.3	24.9	18.7	2回感染 異常なし 127.51(>59.9)
5	男	0回	+	191	212.0	31.2	31.4	22.5	2回感染 異常なし 93.91(>59.9)
6	女	0回	+	25	201.0	36.6	31.6	23.3	2回感染 異常なし 142.21(>59.9)
7	女	0回	+	20.8	1.5	45.9	28.2	19.6	異常なし
6	女	0回	+	27	4.6	40.4	31.7	15.9	異常なし

は、新型コロナウイルスの感染者です。ワクチン接種すると感染した場合に、S抗体が爆増します。ワクチン接種者の中にのみ、腫瘍マーカーが高い人が目立ちます。ワクチン接種者の中に極端に細胞性免疫(CD4のキラーT細胞や、CD56のナチュラルキラー細胞)低下者がいます。
CD8:キラーT細胞は、癌を攻撃し、CD56:ナチュラルキラー細胞は、癌やウイルス、菌を攻撃します。

は、未感染者です。ワクチンの回数が多いと、なかなかS抗体量が下がらず、不眠や頭重などの体調不良も起きています。接種者の中にのみ、腫瘍マーカーの高い人がいます。

COVID19ワクチンを全員接種した医療機関(2024年データ)

COVI D-19 感染者	性別	ワクチン 接種 回数	感染の有 無	S蛋白 抗体 (2024)	N蛋白 抗体 (2024)	CD4 (2024)	CD8 (2024)	CD56 (2024)	腫瘍マーカー他
1	男	2回	+	95000	203.0	27.4	40.7	36.6	2回感染
2	男	3回	+	2446	82.2	37.0	26.3	31.8	
3	男	2回	+	10000	16.7	36.4	34.3	27.7	早期に2回感染? NSE=20.3 ↑(<16.3)
4	女	3回	+	40000	131.0	45.7	31.0	20.3	2回感染
5	女	3回	+	14000	3.0	46.3	34.6	22.2	CA19-9=70.4 ↑(<37)
6	女	2回	+	31000	77.6	36.6	31.6	23.3	
7	女	2回	+	1980	1.0	46.7	28.0	21.1	CA125=56.1 ↑(<35)
8	女	3回	+	6045	3.0	50.3	32.1	22.8	早期に2回感染?
9	女	3回	+	19000	1.7	40.8	32.1	31.0	CA125=43.2 ↑(<35)
10	女	3回	+	11000	8.1	35.2	33.0	32.2	
11	女	2回	+	21000	22.1	48.7	31.9	15.9	CA19-9=57.1 ↑(<37)
12	女	2回	+	4810	0.1	53.6	25.3	5.9	抗核抗体160 (CENTRO)
13	女	2回	+	9790	0.2	42.1	29.4	21.1	抗核抗体320 (HOMO)

COVI D-19 未感染者	性別	ワクチン 接種 回数	感染の有 無	S蛋白 抗体 (2024)	N蛋白 抗体 (2024)	CD4 (2024)	CD8 (2024)	CD56 (2024)	腫瘍マーカー (CEA,CA19- 9,ProGRP,PSA ,HE4,APOA2)
1	男	0回	—	LT0.4	0.1	42.5	34	35.8	異常なし 91.21(>59.9)
2	女	0回	—	LT0.4	0.1	35	39.4	22.5	異常なし 83.01(>59.9)
3	男	0回	—	LT0.4	0.1	44.0	29.1	20.3	異常なし 97.11(>59.9)
4	男	0回	—	LT0.4	0.1	43.0	32.8	14.8	異常なし 76.31(>59.9)
5	女	2回	—	402	0.1	56.8	19.5	19.4	異常なし 91.61(>59.9)
6	女	3回	—	11000	0.1	38.4	34.7	12.6	異常なし 68.71(>59.9)

COVI D-19 未感 染者	ワク チン 接種 回数	感染 の有 無	S蛋白抗 体(2024)	N蛋白 抗体 (2024)	CD4 (2024)	CD8 (2024)	CD56 (2024)		腫瘍マーカー他
1	男	2回	—	602	0.1	30.8	39.5	30.4	
2	男	2回	—	2102	0.1	39.7	29.1	19.7	ProGRP=99.3 ↑ (<u><81</u>)
3	女	4回	—	12000	0.1	44.0	32.0	19.4	CA125=182.1 ↑ (<u><35</u>) RF 16 ↑(<u><15</u>)